丰教发〔2019〕1号附件4

丰台区学校和幼儿园消毒方法及配比浓度

序号	消毒部位	消毒方法	日常消毒浓度	日常配比比例	疫情时期消毒浓度	疫情时期配比比例	作用时间	消毒次数
1	物体表面	擦拭	250毫克/升	水：1升 健之素：1片	1000毫克/升	水：1升 健之素：4片	擦拭（滞留）30分钟	早中晚各一次
2	门把手、水龙头、楼梯扶手	擦拭	250毫克/升	水：1升 健之素：1片	1000毫克/升	水：1升 健之素：4片	擦拭（滞留）30分钟	早中晚各一次
3	床、椅子	擦拭	250毫克/升	水：1升 健之素：1片	1000毫克/升	水：1升 健之素：4片	擦拭（滞留）30分钟	每日一次
4	桌子	擦拭	250毫克/升	水：1升 健之素：1片	1000毫克/升	水：1升 健之素：4片	擦拭（滞留）30分钟	早中晚各一次
5	餐具、炊具、水杯	煮沸或蒸汽					煮沸15分钟或蒸汽10分钟以上	每餐一次
		消毒柜					按照消毒柜使用说明	每餐一次
6	空气	开窗通风。					15分钟	每日两次
		疫情班级，在教室无人的情况下进行紫外线照射。	紫外线灯照射1.5w/立方米		紫外线灯照射1.5w/立方米		60分钟以上	每日一次

7	图书	日光下暴晒					6 小时	每两周一次
8	毛巾	专人专用洗涤剂清洗干净、日光直射下暴晒干燥。					6 小时	每日一次
		煮沸或蒸汽					煮沸 15 分钟或蒸汽 10 分钟以上	每日一次
		浸泡	250 毫克/升	水：1 升 健之素：1 片	500 毫克/升	水：1 升 健之素：2 片	30 分钟	每日一次
9	抹布	煮沸或蒸汽					煮沸 15 分钟或蒸汽 10 分钟以上	每日一次
		浸泡	400 毫克/升	水：1.6 升 健之素：1 片	500 毫克/升	水：1 升 健之素：2 片	30 分钟	每日一次
10	拖鞋	刷洗、浸泡、专人专用	250 毫克/升	水：1 升 健之素：1 片	1000 毫克/升	水：1 升 健之素：4 片	30 分钟	每周一次
11	被褥	日光下暴晒					6 小时	每两周一次
12	玩具	耐湿的，浸泡；不耐湿的，擦拭。	250 毫克/升	水：1 升 健之素：1 片	1000 毫克/升	水：1 升 健之素：4 片	30 分钟	每两周一次
13	毛绒玩具	清洗、蒸汽或煮沸					煮沸 15 分钟或蒸汽 10 分钟以上	每两周一次
14	大型玩具	擦拭、喷洒	250 毫克/升	水：1 升 健之素：1 片	1000 毫克/升	水：1 升 健之素：4 片	30 分钟	每两周一次

15	病人排泄物、呕吐物	稀薄的排泄物或呕吐物	10000 毫克/升---20000 毫克/升	水：1 升 健之素：40-80 片	10000 毫克/升---20000 毫克/升	水：1 升 健之素：40-80 片	按照一份消毒液两份排泄物混合搅拌后静置 2 小时以上	立即消毒
		不成形粪便	漂白粉干粉		漂白粉干粉		按照一份漂白干粉四份粪便的比例混合后静置 2 小时	立即消毒
		成形粪便	50000 毫克/升	水：1 升 健之素：200 片	50000 毫克/升	水：1 升 健之素：200 片	含氯消毒液溶液两份加于一份粪便中，混匀后作用 2 小时	立即消毒
16	便盆、坐便器与皮肤接触部位、盛装吐泻物的容器	浸泡或擦拭	500 毫克/升	水：1 升 健之素：2 片	500 毫克/升	水：1 升 健之素：2 片	30 分钟	随用随消
17	便池	使用含氯消毒剂进行浸泡消毒	500 毫克/升	水：1 升 健之素：2 片	5000 毫克/升----10000 毫克/升	水：1 升 健之素：20-40 片	30 分钟	每日一次
健之素有效氯浓度为 250 毫克的片剂，每 1000 毫升水中加入 1 片。等于消毒浓度为 250mg 每升。 健之素有效氯浓度为 250 毫克的片剂，每 1000 毫升水中加入 4 片。等于消毒浓度为 1000mg 每升。								